



Інструкція
з використання тест-системи
для визначення загального трийодтиронину в сироватці крові
ТЗ-ІФА

IN VITRO

Зберігати при 4-10°C

Принцип методу

У наданій тест-системі використовується принцип конкурентного імуноферментного аналізу. У лунку планшета з іммобілізованим антигеном (специфічні анти-ТЗ-антитіла) вносять досліджуваний зразок та кон'югат (T3, міченій пероксидазою). ТЗ загальний із зразка конкурує з кон'югатом за зв'язок з антигеном на поверхні лунки. Після відмивки активність ферменту, зв'язаного на поверхні лунки планшету, проявляється додаванням субстрату, та вимірюється при довжині хвилі 450 нм.

Інтенсивність кольорової реакції зворотно пропорційна кількості ТЗ загального в зразку.

Клінічне значення

T3, трийодтиронін - амінокислотний гормон щитовидної залози. Виробляється фолікулярними клітинами щитовидної залози під контролем ТТГ – 20%. У периферичних тканинах утворюється при дейодуванні T4 – 80%. Велика частина циркулюючого в крові ТЗ пов'язана з транспортними білками, біологічні ефекти надає вільна частина гормону, що складає приблизно 0.3-0.5% від ТЗ загального. Концентрація ТЗ у крові менша, ніж T4, але біологічна активність його вища (вільної фракції). До 11-15 років досягається рівень загального гормону як у дорослих людей. Зниження концентрації ТЗ в крові відбувається після 65 років. ТЗ регулює споживання кисню тканинами організму, збільшення тепlopродукції, прискорення білкового обміну, впливає на синтез вітаміну А в печінці, знижує концентрацію холестерину та тригліциридів у крові, впливає на екскрецію кальцію з сечою та підсилює резорбцію кісток. Крім того, надає стимулюючу дію на ретикулярну формaciю і коркові процеси в центральній нервовій системі.

Підвищення концентрації ТЗ в крові відбувається при тиреотоксикозі, ендемічному зобі, нестачі йоду, деяких пухлинах щитовидної залози, порушенні синтезу ТТГ, резистентності до тироїдних гормонів, післяпологовій дисфункції щитовидної залози, нефротичному синдромі, важких захворюваннях печінки, системних захворюваннях, стані після гемодіалізу та лікування препаратами радіоактивного йоду, збільшенні маси тіла, мієломі з високим рівнем IgG, прийомі деяких лікарських препаратів (оральних контрацептивів, естрогенів, аміодарону, левотироксину, метадону), геройну.

Зниження концентрації ТЗ в крові зустрічається при гіпотиреозі (первинному, вторинному), гострому тиреоїдіті, післяопераційному стані та важких соматичних захворюваннях, первинній наднірниковій недостатності у стадії декомпенсації, деяких психічних захворюваннях дієті з низьким вмістом білка, прийомі андрогенів, дексаметазону, пропраналола, саліцилатів, похідних кумарину.

Склад набору

- Планшет з іммобілізованим антигеном, 8x12 лунок (1 шт.)
- Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.)
- Набір калібраторів та контролю по 0.5 мл (всього 5 калібраторів: 0, 0.75, 1.5, 7.5, 15 нмоль/л; 1 контроль)
- Відмиваючий розчин концентрат 20х, 22 мл (1 фл.)
- Кон'югат концентрат 2х, 5.5 мл (1 фл.)
- Буфер для розчинення кон'югату, 5.5 мл (1 фл.)
- Субстрат, 11 мл (1 фл.)
- Зупиняючий розчин, 11 мл (1 фл.)

Аналітичні характеристики

Чутливість методу: 0.4 нмоль/л.

Очікуванні коливання контролю 1.0-2.8 нмоль/л.

Коефіцієнт варіації результатів визначень не більш 10%.

Матеріал для дослідження

Використовуйте свіжу, вільну від домішок сироватку крові. Зберігайте зразки не більше 48 годин при 4-10°C. Довгострокове зберігання допускається в замороженому вигляді при температурі -20°C. Повторне заморожування-відтавання не допускається. Не використовуйте мутні, хильозні та гемолітичні зразки.

Перелік необхідного устаткування

Автоматичні одно- та багатоканальні дозатори фіксованого або варіабельного об'єму 5-1000 мкл.

Загальне лабораторне устаткування.

Аналізатор імуноферментний з довжиною хвилі 450 нм.

Підготовка реагентів

- Перед використанням набір витримайте при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. До цього не знімайте стрічку для заклеювання з планшету, щоб не утворювався конденсат.
- Приготуйте відмиваючий розчин. Для цього концентрат розбавте у 20 разів дистильованою водою в чистому посуді (1 мл концентрату + 19 мл дистильованої води). Отриманий розчин стабільний протягом 5-ти діб при кімнатній температурі або 30 діб у холодильнику 4-10°C.
- Підготовка робочого розчину кон'югату: 5,5 мл концентрату кон'югату додайте до 5,5 мл буфера для розчинення кон'югату в співвідношенні 1:1 та ретельно перемішайте. При постановці реакції тільки на частині планшету кількість розчину кон'югату зменшується пропорційно. Робочий розчин кон'югату готовують безпосередньо перед використанням!

Проведення аналізу


- Помістіть у рамку потрібну кількість стрипів - 12 лунок для калібраторів, контролю та зразків в 2 повторах.
- Внесіть у лунки 25 мкл калібраторів, контролю та досліджуваних зразків.
- Внесіть у лунки **100 мкл** робочого розчину кон'югату.
- Інкубуйте 60 хвилин при температурі 37°C.
- Відмийте стрипи 5 разів відмиваючим розчином.
- Внесіть у лунки 100 мкл субстрату.
- Інкубуйте **15-20** хвилин при температурі 20-25°C в темному місці.
- Внесіть у лунки 100 мкл зупиняючого розчину.
- Визначте оптичну щільність (ОЩ) у лунках на фотометрі при довжині хвилі 450 нм. Бланк фотометра виставляйте проти повітря.
- Використовуйте лінійно-логарифмічний метод обчислювання значень.
- Визначте концентрацію ТЗ загального в досліджуваних зразках за допомогою калібрувальної кривої.

Примітки

- Не змішуйте та не використовуйте в одній постановці реагенти різних серій.
- Після використання реагенту негайно закривайте кожен флакон **свісю** кришкою.
- Усі проби і стандарти бажано ставити **в двох паралелях (повторах)**.
- Відмивання планшета може проводитися як вручну, так і з використанням автоматичних пристройів. Вносити по 250 мкл відмиваючого розчину в лунки при кожному відмиванні. Затримка при відмиванні («замочування») не потрібна. Після закінчення ручного відмивання різко перегорніть планшет на фільтрувальний папір для видалення залишків буфера.

Приклад калібрувальної кривої (вісь X – концентрація, нмоль/л; вісь Y – ОЩ)

Не використовувати для обчислювання!



Референтні величини

Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторіями, рекомендуємо користуватися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

	Одиниці нмоль/л		Додаткові одиниці нг/мл	
	нижня межа	верхня межа	нижня межа	верхня межа
Донори	1.2	3.2	0.8	2.1

Перехід в додаткові одиниці 1 нмоль/л = 0.65 нг/мл

Вимоги безпеки

1. Категорично забороняється піпетування ротом.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я».

Умови зберігання

Набір повинен зберігатися при температурі від 4-10°C. Не допускається замороження!

Після розкриття пакета **ретельно заклейте** лунки, що залишилися, стрічкою для заклеювання, щоб запобігти впливу вологи під час зберігання.

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, якщо зберігати його щільно закритим, в захищенному від світла місці та запобігати забруднення під час його використання.

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам ТУ при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 12 міс. з дня виготовлення набору.